

Caqui


Guia de identificação

Diospyros kaki Thunb.



Guia de variedades

Principais variedades de caqui comercializadas na CEAGESP



Ilustrações: Berlindo Borges Filho

Grupo de mercado	Formato do fruto	Coloração da casca	Coloração da polpa	Polpa	Grupo	Embalagem e peso mais comum
Taubaté	Globoso	Vermelha	Amarelada	Mole	Taninoso	
Rama-forte	Achatado	Vermelha	Amarelo-parda	Mole	Variável	Papelão 6 kg
Fuyu	Globoso achatado	Laranja	Amarelo-alaranjada	Crocante	Não taninoso	Papelão 4,5 kg
Kyoto	Ovóide	Laranja	Amarelo-parda	Crocante	Não taninoso	Papelão 6 kg
Guiombo	Ovóide	Laranja	Amarelo-avermelhada	Crocante	Variável	Papelão 8 kg


Tabela de equivalência

Grupo de mercado	Denominação cotação CEAGESP	Denominação mercado atacadista	Classe de valoração	Diâmetro (cm)
Fuyu	A	18 – 24 (2 camadas) ou 9 – 12 (1 camada)	A	Maior que 9,0
Fuyu	B	26 – 34 (2 camadas) ou 13-16 (1 camada)	B	8,0 a 9,0
Fuyu	C	36 – 40 (2 camadas) ou 18 – 20 (1 camada)	C	Menor que 8,0
Guombo	A	Extra 5A / 6A	A	Maior que 7,0
Guombo	B	Extra 3A / 4A	B	6,0 a 7,0
Guombo	C	Extra 1A / 2A	C	Menor que 6,0
Kyoto	A	30 – 32 (2 camadas) ou 15- 16 (1 camada)	A	Maior que 7,0
Kyoto	B	36 – 42 (2 camadas) ou 18-21 (1 camada)	B	6,0 a 7,0
Kyoto	C	60 – 64 (2 camadas) ou 30-32 (1 camada)	C	Menor que 6,0
Rama-forte	A	30 – 32 (2 camadas) ou 15- 16 (1 camada)	A	Maior que 8,0
Rama-forte	B	36 – 42 (2 camadas) ou 18-21 (1 camada)	B	7,0 a 8,0
Rama-forte	C	60 – 64 (2 camadas) ou 30-32 (1 camada)	C	Menor que 7,0

Índices

Grupo de mercado	Denominação cotação CEAGESP	Denominação mercado atacadista	Índice de aproveitamento	Índice de valoração	Índice de escolha
Fuyu	A	18 – 24 (2 camadas) ou 9 – 12 (1 camada)	0,91	1,59	0,57
Fuyu	B	26 – 34 (2 camadas) ou 13-16 (1 camada)	0,91	1,28	0,71
Fuyu	C	36 – 40 (2 camadas) ou 18 – 20 (1 camada)	0,91	1,00	0,91
Guombo	A	Extra 5A / 6A	0,91	1,53	0,59
Guombo	B	Extra 3A / 4A	0,91	1,26	0,72
Guombo	C	Extra 1A / 2A	0,91	1,00	0,91
Kyoto	A	30 – 32 (2 camadas) ou 15- 16 (1 camada)	0,91	1,57	0,58
Kyoto	B	36 – 42 (2 camadas) ou 18-21 (1 camada)	0,91	1,28	0,71
Kyoto	C	60 – 64 (2 camadas) ou 30-32 (1 camada)	0,91	1,00	0,91
Rama-forte	A	30 – 32 (2 camadas) ou 15- 16 (1 camada)	0,91	1,52	0,60
Rama-forte	B	36 – 40 – 42 (2 camadas) ou 18-21 (1 camada)	0,91	1,24	0,73
Rama-forte	C	60 – 64 (2 camadas) ou 30-32 (1 camada)	0,91	1,00	0,91

Sazonalidade



Padrão mínimo de qualidade



Podridão



Ferimento



Imaturo



Passado

Substituições

	Ameixa		Figo		Jabuticaba		Nectarina		Nêspera		Pêra		Pêssego
	Uva		Carambola		Maçã		Caju						

26/04/2021